

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по применению ветеринарного препарата**  
**«Амоксициллин – П 15%»**

**1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1.1 Амоксициллин–П 15% (Amoxicillinum–P 15%).

Международное непатентованное название активной фармацевтической субстанции: амоксициллин.

Лекарственная форма: порошок для перорального применения.

1.2 Амоксициллин–П 15% (далее по тексту - препарат) представляет собой порошок от белого до желтого цвета, в 1 г которого содержится 150 мг амоксициллина тригидрата и вспомогательные вещества: натрия карбонат, декстроза.

1.3 Упаковывают в пакеты из металлизированной полиэтиленовой пленки массой нетто 100 и 1000 г.

1.4 Препарат хранят в заводской упаковке предприятия-изготовителя по списку Б в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0°C до плюс 25°C. Хранить в местах недоступных для детей.

1.5 Срок годности препарата – 3 (три) года от даты изготовления при соблюдении условий хранения. Не применять после окончания срока годности.

**2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

2.1 Амоксициллин является полусинтетическим антибиотиком из группы пенициллинов. Обладает широким спектром бактерицидного действия в отношении грамположительных (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*) и грамотрицательных микроорганизмов (*Actinobacillus spp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella spp.*).

2.2. Амоксициллин препятствует синтезу клеточной стенки бактерии за счет ингибирования ферментов транспептидазы и карбоксипептидазы, что приводит к ее гибели.

2.3 При применении амоксициллина максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1 – 2 часа после введения препарата и сохраняется на терапевтическом уровне в течение 48 часов. Практически не метаболизируется. Выделяется из организма преимущественно с мочой, в меньшей степени с молоком и с желчью.

**3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ**

3.1 Препарат применяют для лечения молодняка свиней при инфекциях желудочно-кишечного и респираторного тракта: сальмонеллёз, колибактериоз, стрептококкоз, пневмонии, бронхопневмонии бактериальной этиологии; заболеваниях урогенитального тракта, септицемии, секундарных осложнениях, а также для лечения птицы при желудочно-кишечных заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к действию амоксициллина.

3.2 Препарат применяют перорально, в смеси с кормом, молоком или водой, в течение 5-7 дней, в следующих дозах:

- поросётам до шестимесячного возраста препарат можно задавать из расчета 53-80 г на 100 литров воды или молока;

- поросётам старше шестимесячного возраста – 80-159 г препарата на 100 литров воды.

Питьевая вода с препаратом используется как единственная жидкость для питья.

С кормом препарат применяют из расчета 2 кг препарата на тонну.

Препарат смешивают с кормом или кормосмесями на комбикормовых заводах или кормоцехах хозяйств, применяя существующие технологии. Амоксициллина тригидрат в препарате является термостабильным и не теряет своих свойств после нагревания до 85°C.

Птице (цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур-несушек, гусятам, индюшатам и утятам) в возрасте до четырех недель жизни препарат назначают из расчета 34 -38 г на 100 литров воды, птице старше четырех недельного возраста препарат назначают из расчета 56 - 64 г на 100 литров воды, в течение 3-5 дней, с питьевой водой как единственной жидко-

стью для питья. Препарат предварительно растворяют в небольшом количестве воды, добавляя воду к препарату, после чего раствор разбавляют водой до необходимой концентрации.

3.3 Приготовленный раствор препарата необходимо использовать в течение 24 ч.

3.4 Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность животных к пенициллинам. Нельзя применять препарат совместно с тетрациклинами, амфениколами, макролидами, линкозамидами и сульфаниламидами.

3.5 Препарат запрещается применять курам-несушкам, яйцо которых используется в пищу людям.

3.6 В рекомендуемых дозах не оказывает отрицательного действия, однако у животных с повышенной чувствительностью к бета-лактамам антибиотикам (пенициллины, цефалоспорины) возможны различные аллергические реакции.

3.7 При возникновении аллергических и других побочных реакций препарат отменяют и назначают антигистаминные препараты и препараты кальция.

3.8 Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 15 суток после последнего применения препарата. Убой птицы разрешается не ранее, чем через 5 суток после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя животных и птицы ранее указанного срока, мясо используют на корм плотоядным животным.

#### 4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом необходимо соблюдать общепринятые меры личной гигиены и техники безопасности.

4.2 При попадании составных компонентов или препарата на кожу или слизистые оболочки необходимо смыть их водой.

#### 5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1. В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбирается не менее 3-х невскрытых упаковок препарата из серии вызвавшей осложнение, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов г. Минск, ул. Красная 19-а, тел. 290-42-75.

#### 6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1. Производственный кооператив «Биогель» Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65, офис 313 по заказу Частного производственно-торгового унитарного предприятия «Летуаль» Республика Беларусь, 220091, г. Минск, ул. Инженерная д. 1е.

Инструкция по применению препарата разработана сотрудниками ПК «Биогель» (Янушевская Л.Е., Безбородкин А.Н.) и РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» (Кучинский М.П.).

*индустрия*

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь	
Совет по ветеринарным препаратам	
<b>ОДОБРЕНО</b>	
Председатель	<i>[Подпись]</i>
Секретарь	<i>[Подпись]</i>
Эксперт	<i>[Подпись]</i>
<i>23</i>	<i>12</i> 20 <i>20</i> протокол № <i>112</i>